

P. 159 in: Mocsáry, S., Szépligeti, G. Hymenopterák (Hymenopteren). Pp.

RECORDED
IN ANTHRIP

121-159 in: Horváth, G. Zichy Jenő Gróf harmadik ázsiai utazásának állattani eredményei. Vol. 2. Budapest: V. Hornyánsky, xli + 470 pp.

HYMENOPTERÁK. — HYMENOPTEREN.

[1901]

159

A *Cleptes nitidulus* FABR nőstényéhez hasonló s azzal közel rokon; de kissé nagyobb, egész testét ritkás fehéres szőrözet fedi, feje, középtörának a háta a paizsszal és középső melloldalai más színűek, arcza erősebben pontozott, csápjainak tő-íze, szárnyainak a töve s lábai rőtbarán-sárgák, az utótor hátulsó oldalfogai rövidebbek s vékonyabbak, potrohának hátszelvényei közül a 2—3 sokkal szétszórtabban finoman pontozott, a harmadiknak oldalai s a negyedik élénk ibolyakékes búzavirág-kékek és szárnyai kissé világosabbak.

Feminae *Cleptes nitiduli* FABR. similis et affinis; sed parum maior, totus parcius albido-pilosus, capite, mesonoto cum scutello et mesopleuris aliter coloratis, facie fortius punctata, antennarum scapo, alarum tegulis pedibusque rufo-testaceis, metanotidibus postico-lateralibus brevioribus minus validis, abdominis segmentis dorsalibus 2—3 multo dispersius subtiliter punctulatis, tertii lateribus quartoque laete violascenti-cyaneis, alis parum dilutioribus species mihi distincta esse videtur.

306. *Messor barbarus* LINN. var. *lobulifera* EMERY n. var.

Dolgozó. — A *straticiceps* ANDRÉ alfaj kisebb testalkatú válfajai között ez az új válfaj csápjá töltének karélya miatt a *lobicornis* FOREL algériai alakjaival megegyezik; de ettől könnyen megkülönböztethető: fejének másféle vésményei miatt.

Feje homályos, hosszában sűrűn ránczos, a ránczok között a pontozatok fehéres, tompa sörteszálakkal; tora szabálytalanul finoman redős, homályos, az utótor fenyvertelen, vagy mindkét oldalán kerekded dúddal ellátott. A potroh nyele homályos, kissé ránczos; hasa fényes. Fekete, felső állkapcsai, csápjai és lábai barnásak. — Hossza 4—5 mm.

Mongolia: Burgaltai, négy példány.

E válfajhoz nagyon közel áll az, melyet FOREL tanár a Himalayából közölt velem.

Operaria. — Inter varietates staturae minoris subspecies *straticiceps* ANDRÉ adscribendas haec nova lobo baseos scapi cum forma algirica *lobicornis* FOR. congruit, sed sculptura capitis diversa agnoscenda.

Caput opacum, confertim longitrusum rugosum, punctis inter rugas setulas albidas, obtusas gerentibus; thorax irregulariter subtiliter rugosus, opacus, epinoto mutico vel utrinque tuberculo rotundato instructo. Petiolus opacus, rugulosus; gaster nitida. Color niger, mandibulis, antennis pedibusque fuscis. — Long. 4—5 mm.

Mongolia: Burgaltai, specimina 4.

Varietatem huic affinem ex Himalaya communicavit Prof. FOREL.

(EMERY.)

321. *Formica nasuta* NYL. subspec. *mongolica* EMERY n. subspec.

Dolgozó. — A Földközi-tenger környékén élő tipikus fajnál sokkal kisebb, kevésbé karcsú, a dolgozó feje kisebb, rövidebb, csápostörának ízei rövidebbek. Színe, mint a tipikus példányoknál; a finom, pelyhes szőrözet a nagyító üveg alatt csak alig látható, a felálló szőrszálak nagyon kevés számúak. — Hossza 2—4 1/4 mm.

Mongolia: Chara-gol, három példány.

Operaria. — Typo speciei mediterraneo multo minor, minus gracilis, capite in operaria minore, brevior, antennarum funiculi articulis brevioribus. Color ut in typo; pubes tantum microscopica, vix conspicua, pili erecti paucissimi. — Long. 2—4 1/4 mm.

Mongolia: Chara-gol, specimina 3.

(EMERY.)

